


4.5.2 โรคใบด่างมันสำปะหลัง

- พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 513,595 ไร่ จากการรายงานในระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการรักษาพืชและจัดการดินปุ๋ย พบพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 20 อำเภอ พื้นที่การระบาด 69,033.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.44 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)

1. อำเภอน้ำยืน	พื้นที่การระบาด 4,519.80 ไร่	11. อำเภอเขมราฐ	พื้นที่การระบาด 1,967.67 ไร่
2. อำเภอนาจะหลวย	พื้นที่การระบาด 16,250.18 ไร่	12. อำเภอพิบูลมังสาหาร	พื้นที่การระบาด 1,810.66 ไร่
3. อำเภอตระการพืชผล	พื้นที่การระบาด 15,373 ไร่	13. อำเภอนาเยีย	พื้นที่การระบาด 1,464.71 ไร่
4. อำเภอศรีเมืองใหม่	พื้นที่การระบาด 1,320.61 ไร่	14. อำเภอโพธิ์ไทร	พื้นที่การระบาด 540 ไร่
5. อำเภอโขงเจียม	พื้นที่การระบาด 1,271.61 ไร่	15. อำเภอน้ำขุ่น	พื้นที่การระบาด 965.85 ไร่
6. อำเภอทุ่งศรีอุดม	พื้นที่การระบาด 8,593.41 ไร่	16. อำเภอตาลสุม	พื้นที่การระบาด 841.54 ไร่
7. อำเภอเดชอุดม	พื้นที่การระบาด 3,532.48 ไร่	17. อำเภอสว่างวีระวงศ์	พื้นที่การระบาด 735.08 ไร่
8. อำเภอบุณฑริก	พื้นที่การระบาด 3,425.48 ไร่	18. อำเภอกุดข้าวปุ้น	พื้นที่การระบาด 140 ไร่
9. อำเภอวารินชำราบ	พื้นที่การระบาด 3,196.51 ไร่	19. อำเภอนาตาล	พื้นที่การระบาด 72.03 ไร่
10. อำเภอสิรินธร	พื้นที่การระบาด 3,003.59 ไร่	20. อำเภอโขงเจียม	พื้นที่การระบาด 9.13 ไร่

- พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 513,595 ไร่ จากการรายงานในระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการรักษาพืชและจัดการดินปุ๋ย พบพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 20 อำเภอ พื้นที่การระบาด 69,033.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.44



1. การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

- 1.1 สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการ โรคใบด่างมันสำปะหลัง
- 1.2. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ย <http://report-ppsf.doae.go.th/> ภายในวันพุธ ก่อน 12.00 น. ของทุกสัปดาห์
- 1.3 รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ย <http://report-ppsf.doae.go.th/> ภายในวันพุธ ก่อน 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งส่งแบบรายงานคำนวณพื้นที่ความหนาแน่นการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามสูตรทาโรยามาเน่ และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการสำรวจพื้นที่
- 1.4 ปรับข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหว ทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

2. สारวสถานการณั้ระบาคของหนอนหัวดามะพรวาว

พบการระบาคจํานวน 44,313.76 ไร่ โดยจังหวดที่พบพื้นที่การระบาคสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวดประจวบคีรีขันธ์ (35,945.75 ไร่) ชลบุรี (2,839.50 ไร่) สุราษฏร์ธานี (1,399.75 ไร่) สมุทรสาคร (818.50 ไร่) และจังหวดเพชรบุรี (581.75 ไร่)

2.1 ขอให้เรงสำรวจข้อมูลสถานการณั้การระบาคของหนอนหัวดามะพรวาว (สำรวจรายตั่น) และรายงานผลการสำรวจตามแบบฟอร์ม (ระดับอำเภอ) พร้อมจัดสงข้อมูลให้จังหวดอุบลราชธานีทราบ ภายในวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2568 และหากสำรวจข้อมูลสถานการณั้การระบาคของหนอนหัวดามะพรวาวแล้วไม่พบการระบาค ขอให้แจ่งจังหวดอุบลราชธานีทราบด้วย

2.2 ในระหว่างดําเนินการสำรวจข้อมูล ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำเกษตรกรว่า ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลสถานการณั้การระบาคของหนอนหัวดามะพรวาวดังกล่าวนี้ เป็นการสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเบื่องตั่นเท่านั้น ซึ่งระหว่างนี้สำนักงานเกษตรอำเภอ ต้องแนะนำให้เกษตรกรจัดการแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่อง และหากประเมินแล้วพบว่าเกิดการระบาคอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ควรแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อดัตรวจการระบาคและควรบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่รกร้าง ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของศัตรูมะพรวาว เพื่อให้สามารถป้องกัน ควบคุม และกำจัดหนอนหัวดามะพรวาวได้อย่างทันท่วงที และสอดคลองกับสถานการณั้การระบาคในพื้นที่