

1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง

1.1 พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 453,044 ไร่ จากการรายงานในระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พบพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 5 อำเภอ พื้นที่การระบาด 3,665.9 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568)

1. อำเภอเดชอุดม	พื้นที่การระบาด 375.84 ไร่
2. อำเภอน้ำขุ่น	พื้นที่การระบาด 965.85 ไร่
3. อำเภวารินชำราบ	พื้นที่การระบาด 150 ไร่
4. อำเภอนาเยีย	พื้นที่การระบาด 1,464.71 ไร่
5. อำเภอสว่างวีระวงศ์	พื้นที่การระบาด 668 ไร่
6. อำเภอโพธิ์ไทร	พื้นที่การระบาด 41.5 ไร่

1.2 การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

1. สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
2. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย <http://report-ppsf.doae.go.th/> ภายในวันพุธ ก่อน 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งส่งแบบรายงานคำนวณพื้นที่ความหนาแน่นการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามสูตรทาโรยามาเน่ และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการสำรวจพื้นที่ฯ
3. ปรับข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่