


โรคใบด่างมันสำปะหลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก พบการระบาดในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมพื้นที่การระบาด จำนวน 17,418.35 ไร่ คิดเป็น 4.75% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568)



มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง



การสร้างการรับรู้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน กำจัด และผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง



การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด

1. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง ในระบบรายงาน <https://eport-ppsf.doae.go.th> อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยะอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60



การควบคุมการระบาด

1. พื้นที่เริ่มพบการระบาดหรือพบการระบาดไม่มาก สามารถถอนทำลายต้นเป็นโรคได้ ขอความร่วมมือเกษตรกรทำลายต้นเป็นโรคและแมลงหวั่นขาวยาสูบพาหะนำโรคตามหลักวิชาการ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายของผลผลิต
2. พื้นที่พบการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง แนะนำเกษตรกรพักแปลง เปลี่ยนพืชปลูกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่
3. ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการพิจารณาดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ก่อนพันธุ์มันสำปะหลัง