

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก พบการระบาดในพื้นที่ 10 อำเภอ รวมพื้นที่การระบาด จำนวน 34,305.35 ไร่ คิดเป็น 7.87 % (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568)

อำเภอภูพาน
พื้นที่การระบาด 408 ไร่

อำเภอतालसुम
พื้นที่การระบาด 4,837 ไร่

อำเภอวารินชำราบ
พื้นที่การระบาด 150 ไร่

อำเภอนาเยีย
พื้นที่การระบาด 1,464 ไร่

อำเภอน้ำขุ่น
พื้นที่การระบาด 967.85 ไร่

อำเภอโพธิ์ไทร
พื้นที่การระบาด 12,439.50 ไร่

อำเภอศรีเมืองใหม่
พื้นที่การระบาด 12,931 ไร่

อำเภอดอนมดแดง
พื้นที่การระบาด 145 ไร่

อำเภอสว่างวีระวงศ์
พื้นที่การระบาด 668 ไร่

อำเภอนาจะหลวย
พื้นที่การระบาด 25 ไร่



มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง



การสร้างการรับรู้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน กำจัด และผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง



การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด

1. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง ในระบบรายงาน <https://eport-ppsf.doae.go.th> อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยะอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60

การควบคุมการระบาด

1. พื้นที่เริ่มพบการระบาดหรือพบการระบาดไม่มาก สามารถถอนทำลายต้นเป็นโรคได้ ขอความร่วมมือเกษตรกรทำลายต้นเป็นโรคและแมลงหวั่นขาวยาสูบพาหะนำโรคตามหลักวิชาการ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายของผลผลิต
2. พื้นที่พบการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง แนะนำเกษตรกรพักแปลง เปลี่ยนพืชปลูกที่มีความเหมาะสมในพื้นที่
3. ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการพิจารณาดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง