





ระเบียบวาระการประชุม

เดือนกันยายน

2567






1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง (เรื่องเพื่อทราบ)



1.1 สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในระบบรายงานสถานการณ์ระบาด ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก พบการระบาดในพื้นที่ 9 อำเภอ รวมพื้นที่การระบาด จำนวน 2,605 ไร่ คิดเป็น 0.5% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2567)

- อำเภอศรีเมืองใหม่ พื้นที่การระบาด 40 ไร่
 - อำเภอเขื่องใน พื้นที่การระบาด 10 ไร่
 - อำเภอเขมราฐ พื้นที่การระบาด 60 ไร่
 - อำเภอโพธิ์ไทร พื้นที่การระบาด 831 ไร่
 - อำเภอทุ่งศรีอุดม พื้นที่การระบาด 45 ไร่
 - อำเภอสว่างวีระวงศ์ พื้นที่การระบาด 668 ไร่
 - อำเภอโขงเจียม พื้นที่การระบาด 160 ไร่
 - อำเภอน้ำยืน พื้นที่การระบาด 784 ไร่
 - อำเภอเหล่าเสือโก้ก พื้นที่การระบาด 7 ไร่
- 

1.2 การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

- 1.สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการประชุม งานรณรงค์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรโดยเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และนำไปสู่การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
3. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืชและการดินปุ๋ย [HTTP://REPORT-PPSF.DOAE.GO.TH/](http://report-ppsf.doae.go.th/)
4. ปรับข้อมูลพื้นที่ยืนต้นในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่
5. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จนถึงระยะการเก็บเกี่ยว ไม่ให้นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป
6. ฝ้าระวังและสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหิวขาวยาสุมแพร่ระบาดในแปลงมันสำปะหลัง

1.3 วิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ลักษณะอาการของโรค คือ ยอดอ่อนและใบแสดงอาการด่างเขียวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเข้ม ใบมีขนาดเล็ก หักงอ และเสีयरูปทรง การแพร่ระบาดมีสาเหตุมาจากท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหิวขาวยาสูบ เป็นแมลงพาหะ ถ่ายทอดเชื้อสาเหตุ กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

1. เลือกปลูกมันสำปะหลังพันธุ์สะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
2. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89
3. ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างโดยวิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ และวิธีบดสับ
4. กำจัดแมลงหิวขาวยาสูบ โดยพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
5. ฝักระวังพืชอาศัยของแมลงหิวขาวยาสูบ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชี ฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สับดำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลังด้วย
6. ไม่นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรค ปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป

