



ระเบียบบวาระการประชุม

ประจำเดือนตุลาคม

1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง (เรื่องเพื่อทราบ)



1.1 สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในระบบรายงานสถานการณ์ระบาด

ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก พบการระบาดในพื้นที่ 11 อำเภอ รวมพื้นที่การระบาด

จำนวน 3,244 ไร่ คิดเป็น 0.6% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567)

- | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| • อำเภอศรีเมืองใหม่ | พื้นที่การระบาด 40 ไร่ | • อำเภอเดชอุดม | พื้นที่การระบาด 594 ไร่ |
| • อำเภอโขงเจียม | พื้นที่การระบาด 10 ไร่ | • อำเภอโขงเจียม | พื้นที่การระบาด 160 ไร่ |
| • อำเภอเขมราฐ | พื้นที่การระบาด 60 ไร่ | • อำเภอน้ำยืน | พื้นที่การระบาด 784 ไร่ |
| • อำเภอโพธิ์ไทย | พื้นที่การระบาด 831 ไร่ | • อำเภอเหล่าเสือโก้ก | พื้นที่การระบาด 7 ไร่ |
| • อำเภอทุ่งศรีอุดม | พื้นที่การระบาด 45 ไร่ | • อำเภอดอนมดแดง | พื้นที่การระบาด 45 ไร่ |
| • อำเภอสว่างวีระวงศ์ | พื้นที่การระบาด 668 ไร่ | | |

1.2 การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

- 1.สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการประชุม งานรณรงค์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรโดยเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และนำไปสู่การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
3. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืชและการดินปุ๋ย [HTTP://REPORT-PPSF.DOAE.GO.TH/](http://REPORT-PPSF.DOAE.GO.TH/)
4. ปรับข้อมูลพื้นที่ยืนต้นในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่
5. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จนถึงระยะการเก็บเกี่ยว ไม่ให้นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป
6. ฝักระวังและสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหิวขาอย่าสูบแพร่ระบาดในแปลงมันสำปะหลัง

1.3 วิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ลักษณะอาการของโรค คือ ยอดอ่อนและใบแสดงอาการด่างเขียวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเข้ม ใบมีขนาดเล็ก หักงอ และเสียรูปทรง การแพร่ระบาดมีสาเหตุมาจากท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหี้ย์ขาวยาสูบ เป็นแมลงพาหะ ถ่ายทอดเชื้อสาเหตุ กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

1. เลือกปลูกมันสำปะหลังพันธุ์สะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
2. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89
3. ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างโดยวิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ และวิธีบดสับ
4. กำจัดแมลงหี้ย์ขาวยาสูบ โดยพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
5. ฝ้าระวังพืชอาศัยของแมลงหี้ย์ขาวยาสูบ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชี ฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สับปะรด ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลังด้วย
6. ไม่นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรค ปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป

1.4 จากการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจและประเมินพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

1. ทบทวนข้อมูลพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ โดยให้ติดตามสถานการณ์ตามรายแปลง หากเป็นไปได้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ติดตามผลในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป
3. เน้นย้ำเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลพื้นที่ระบาด ตามหลักการของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane)
4. การรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก
ภายในวันพุธ ก่อน 12.00 น. ของทุกสัปดาห์