

4.5.1โรคใบด่างมันสำปะหลัง (เรื่องเพื่อทราบ)

1. สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก พบการระบาดในพื้นที่ 21 อำเภอ รวมพื้นที่การระบาด จำนวน ๑๒๔,๔๕๐.๗๘ ไร่ คิดเป็น 24.23% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567)

1. อำเภอศรีเมืองใหม่	พื้นที่การระบาด 12,369.53 ไร่
2. อำเภอโขงเจียม	พื้นที่การระบาด 8,742.38 ไร่
3. อำเภอโขงโน	พื้นที่การระบาด 9.13 ไร่
4. อำเภอเขมราฐ	พื้นที่การระบาด 1,967.67 ไร่
5. อำเภอเดชอุดม	พื้นที่การระบาด 4,538.85 ไร่
6. อำเภอนาจะหลวย	พื้นที่การระบาด 25,791.81 ไร่
7. อำเภอน้ำยืน	พื้นที่การระบาด 30,419.30 ไร่
8. อำเภอตระการพืชผล	พื้นที่การระบาด 16,881.21 ไร่
9. อำเภอพิบูลมังสาหาร	พื้นที่การระบาด 1,814 ไร่
10. อำเภอโพธิ์ไทร	พื้นที่การระบาด 1,330 ไร่

11. อำเภอเหล่าเสือโก้ก	พื้นที่การระบาด 28.25 ไร่
12. อำเภอดอนมดแดง	พื้นที่การระบาด 442.01 ไร่
13. อำเภอทุ่งศรีอุดม	พื้นที่การระบาด 8,593.41 ไร่
14. อำเภอสว่างวีระวงศ์	พื้นที่การระบาด 735.08 ไร่
15. อำเภอน้ำขุ่น	พื้นที่การระบาด 965.85 ไร่
16. อำเภอตาลสุม	พื้นที่การระบาด 841.54 ไร่
17. อำเภอกุดข้าวปุ้น	พื้นที่การระบาด 440.41 ไร่
18. อำเภอวารินชำราบ	พื้นที่การระบาด 2,038.89 ไร่
19. อำเภอสิรินธร	พื้นที่การระบาด 3,003.59 ไร่
20. อำเภอบุญทริก	พื้นที่การระบาด 3,425.78 ไร่
21. อำเภอนาตาล	พื้นที่การระบาด 72.03 ไร่

2. การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่

แนวทางการสำรวจพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้

1. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการประชุม งานรณรงค์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรโดยเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และนำไปสู่การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยประเมินพื้นที่ระบาดตามคู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
3. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย <http://report-ppsf.doae.go.th/> ภายในวันพุธ ก่อน 12.00 น. ของทุกสัปดาห์

4. ปรับข้อมูลพื้นที่ยืนต้นในระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งบางชนิดพืชมีการเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่
5. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จนถึงระยะการเก็บเกี่ยว ไม่ให้นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อในฤดูกาลปลูกถัดไป
6. เฝ้าระวังและสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหีวขาวยาสูบแพร่ระบาดในแปลงมันสำปะหลัง
7. เน้นย้ำการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล พร้อมทั้งคำนวณพื้นที่การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังรายอำเภอตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการสำรวจพื้นที่โรคใบด่างมันสำปะหลัง